

Medicarine, tabletovaný dezinfekční přípravek

Biocidní přípravek

Tabletovaný dezinfekční přípravek na bázi aktivního chloru. Vhodný k dezinfekci všech omyvatelných ploch a povrchů odolných působení chloru postřikem, otěrem, případně ponořením. Tablety umožňují přesné a snadné dávkování.



- účinné látky: dichlorisokyanurát sodný, obsah 1,5 g aktivního chloru v 1 tabletě
- silný a rychlý účinek (účinnost na MRSA potvrzena v koncentraci 1 tableta / 10 l vody s expozicí 5 minut)
- jednoduché dávkování
- kompatibilní s řadou materiálů
- **oblast použití:** dezinfekce veškerých omyvatelných ploch a předmětů odolných působení chloru
- pouze pro profesionální použití (před použitím čtěte přiložené pokyny)

Spektrum účinnosti přípravku Medicarine

- baktericidní, virucidní (včetně HBV a HIV), fungicidní a tuberkulocidní

Doporučený způsob použití přípravku Medicarine

Dezinfekční roztok připravte bezprostředně před použitím rozpuštěním příslušného počtu tablet ve studené vodě. Předem odstraňte z ploch a předmětů viditelné znečištění. Roztok se aplikuje pomocí otěru či postřiku. Malé voděodolné předměty lze dezinfikovat ponořením do roztoku. Po předepsanou dobu expozice musí zůstat plochy a předměty smočené roztokem. Plochy a předměty, které mají přijít do kontaktu s vodou, potravinami nebo krmivy, opláchněte po dezinfekci důkladně pitnou vodou. Pro zvýšení čisticí účinnosti pracovních roztoků je doporučena kombinace s neutrálními nebo mírně zásaditými (pH do 10,0) čisticími prostředky. Nemíchat s kyselými čisticími prostředky!

Použití	Koncentrace	Doba expozice
Dezinfekce všech omyvatelných ploch a předmětů	2 tbl / 10 l vody	5 min
Biologické znečištění (krev, hnís, výměšky)	1 tbl / 1,5 l vody	30 min
Účinek na HBV (virus hepatitidy B)	1 tbl / 1,5 l vody	30 min
Účinek na TBC	2 tbl / 10 l vody	30 min

Obj. číslo	Kat. číslo	Popis balení	Obsah	Dostupnost	Cena / ks
900 033 039 640	3039640	Dóza	300 ks	3-4 týdny	1 807 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Bezpečnostní-list-Medicarine.pdf